

# AVALON 250 EW

## COMPOSIZIONE

Tebuconazolo puro  
g 24,03 (250 g/l)

## FORMULAZIONE

Emulsione Acquosa

## CONFEZIONI

bottiglia 1 l  
tanica 5 l

## CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

## REGISTRAZIONE Min. San.

n. 14846 del 31/01/2011



## CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida in formulazione concentrato emulsionabile ad azione preventiva, curativa ed eradicante. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e traslocano attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Coltura	Parassita	Dose max. f.c. (ml/hl)	Dose max. f.c. (ml/ha)
<b>FRUMENTO, SEGALE</b>	Oidio, Ruggini, Fusarium, Septoria	250	1000
<b>ORZO, AVENA</b>	Oidio, Ruggini, Fusarium, Septoria	215	865
<b>MELO</b>	Ticchiolatura Oidio	50 80	800 1000
<b>PERO</b>	Ticchiolatura, Maculatura bruna	50 80	800 1000
<b>ALBICOCCO, PESCO E NETTARINO</b>	Monilia, Oidio, Botrytis, Ruggine	80	1000
<b>VITE DA VINO</b>	Oidio	40	400
<b>CARCIOFO, MELONE, ZUCCHINO, AGLIO, PEPERONE</b>	Oidio, Ruggini Ruggine dell'aglio	50	500
<b>POMODORO</b>	Oidio	100	1000
<b>TAPPETI ERBOSI</b>	Microdochium nivale, Sceloritinia, Rhizoctonia	250	2000

Coltura	N. max. Trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri ad ettaro)
<b>FRUMENTO, SEGALE</b>	2	400-600
<b>ORZO, AVENA</b>	1	400-600
<b>MELO, PERO, ALBICOCCO, PESCO E NETTARINO</b>	3	1000-1250
<b>VITE DA VINO</b>	3	1000
<b>CARCIOFO, MELONE, ZUCCHINO, AGLIO, PEPERONE</b>	4	800-1000
<b>POMODORO</b>	3	800-1000
<b>TAPPETI ERBOSI</b>	2	600-800

# AVALON 250 EW

## COMPATIBILITA'

**Il prodotto è compatibile con insetticidi e altri fungicidi a reazione neutra.**

## AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

## FITOSSICITA'

**Su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.**

## RISCHI DI NOCIVITA'

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

## INTERVALLO DI SICUREZZA

- **3 giorni prima del raccolto** per pomodoro, peperone e zucchini;
- **7 giorni** per carciofo, melone, pesco e nettarino, albicocco;
- **21 giorni** per aglio;
- **30 giorni** per vite da vino;
- **35 giorni** per frumento e segale;
- **60 giorni** per pero e melo;
- sospendere i trattamenti a **fine fioritura** per orzo e avena.