

# ABALAR



## COMPOSIZIONE

Esfenvalerate  
2,8% (25 g/l)

## FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

## CONFEZIONI

bottiglia 1 l

## CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

## REGISTRAZIONE Min. San.

n. 14751 del 15/07/2011



## CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

**ABALAR** agisce rapidamente e con una buona persistenza per contatto ed ingestione nei confronti dei numerosi fitofagi in frutticoltura ed orticoltura. La modalità di azione non sistemica richiede una uniforme bagnatura delle parti delle piante da proteggere per favorire l'azione di contatto ed ingestione.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
<b>VITE</b>	15 giorni	Tignoletta ( <i>Lobesia botrana</i> ) Totrice ( <i>Sparganothis spp.</i> )	0,4-0,6 l/ha	Massimo 2 trattamenti
<b>POMODORO</b> (in serra e in pieno campo)	3 giorni	Larve di nottue ( <i>Heliothis armiaera</i> , <i>Autographa gamma</i> )	0,4-0,6 l/ha	Massimo 2 trattamenti durante la fioritura ogni 15 giorni
<b>OLIVO</b>		Tignola dell'olivo ( <i>Prays oleae</i> )	0,48-0,6 l/ha	Massimo 2 trattamenti
<b>PEPERONI</b> (in serra e in pieno campo)	3 giorni	Mosca bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> ) Nottue ( <i>Plusia</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Helicoverpa</i> , <i>Ostrinia</i> ) Afdi	0,4-0,6 l/ha	Massimo 2 trattamenti ogni 15 giorni
<b>BROCCOLI</b>	7 giorni	Mosca bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> ) Nottue ( <i>Plusia</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Helicoverpa</i> , <i>Ostrinia</i> ) Afdi	0,4-0,6 l/ha	Massimo 2 trattamenti ogni 15 giorni
<b>LATTUGHE</b>	9 giorni	Mosca bianca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> ) Nottue ( <i>Plusia</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Helicoverpa</i> , <i>Ostrinia</i> ) Afdi ( <i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> )	0,4-0,54 l/ha	Massimo 2 trattamenti ogni 15 giorni

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 5-10 ettolitri di acqua per ettaro su vite 8-10 su olivo, 3-9 su lattuga, 8-12 su pomodoro e 3-10 sulle altre colture. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotta (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari impiegabili contro altri fitofagi e parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate. Comunque, dato che non tutte le possibili combinazioni sono state esaminate, è consigliabile verificare la stabilità e selettività delle miscele che si intende attuare. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

**FITOTOSSICITÀ:** Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo.