

ASCOT



COMPOSIZIONE

Lambda-Cialotrina 2,5%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astucci 1 Kg

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE

REGISTRAZIONE Min. San.

n. 14945 del 03/08/2011



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

ASCOT è un insetticida dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce principalmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede inoltre effetto repellente, è dotato di rapido potere abbattente e persistente efficacia protettiva.

Colture	Tempo di carenza	Avversità	Dose d'impiego	Note
PESCO, NETTARINE E PERCOCHE	7 giorni	Afide verde Mosca mediterranea	0,4-0,8 kg/ha	Massimo 2 trattamenti
MELO, PERO	7 giorni	Afidi verde Carpocapsa Psylla del Pero	40-80 g/hl (0,32-0,8 kg/ha)	Massimo 2 trattamenti
OLIVO	-	Tignola - Interventi nei confronti della generazione antofaga	40-80 g/hl (0,32-0,8 kg/ha)	Massimo 2 trattamenti
PATATA	15 giorni	Afide verde Dorifora	0,4-0,8 kg/ha	Massimo 2 trattamenti
TABACCO	60 giorni	Afidi, Mosca bianca Tripidi, Pulce del tabacco Nottue defogliatrici	40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha) 60-80 g/hl (0,4-0,8 kg/ha) 40-50 g/hl	Massimo 2 trattamenti
FLOREALI e ORNAMENTALI	-	Afidi, Mosca bianca Tripidi Bega del Garofano Nottue	40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha) 100-120 g/hl (0,42-0,8 kg/ha) 80-100 g/hl (0,7-1,2 kg/ha) 0,4-0,5 kg/ha	Massimo 2 trattamenti

In tutti i casi effettuare massimo 2 trattamenti all'anno, mantenendo un intervallo di 15 giorni.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, accertarne preventivamente la compatibilità fisica preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare piccole prove di saggio prima del trattamento.