

CELL

COMPOSIZIONE

Deltametrina pura
2,81% (25 g/l)

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

CONFEZIONI

bottiglia 0,250 l
bottiglia 1 l
tanica 5 l

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

REGISTRAZIONE Min. San.

n. 13796 del 30/11/2011



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

CELL è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con grande sicurezza d'impiego.

FRUTTICOLTURA (MELO, PERO, PESCO, ALBICOCCO): contro psilla 0.75 L/ha, afide verde del melo, afide del pesco (*Myzus spp.*, *Hyalopterus spp.*, *Brachycaudus persicae*) L/ha 0.3-0.5, cocciniglia di S. Josè 0.5-0.75 L/ha (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 0.30 L/ha, cidia e anarsia 0.50-0.70 L/ha, capua, cacoecia ed altri tortricidi 0.30-0.50 L/ha, micro lepidotteri del melo e del pero 0.30-0.50 L/ha. Contro antonoma, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 0.30-0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

VITICOLTURA: contro tignole 0.40-0.60 L/ha, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 0.30-0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

OLIVICOLTURA: contro *Saissetia* 0.40-0.60 L/ha, tignola (*Prays oleae*) e tripide 0.50 L/ha, mosca delle olive 0.50 L/ha, in trattamento preventivo. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

ORTICOLTURA (CARCIOFO, CAVOLI CAPPUCCI, LATTUGHE ED INSALATE (ESCLUSO LA SCAROLA E LE BABY LEAF DI CICORIA, SPINACIO E BIETOLA DA FOGLIA), CIPOLLA, PORRO, CETRIOLI, MELANZANE, POMODORI, PEPERONI, PISELLI, FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVE, CAROTE, PATATE, FRAGOLE): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini 0.30 L/ha, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria 0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg (7 gg in serra per tutte le colture eccetto fragola e fagioli/fagiolini).

CEREALI:

- **MAIS** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi 0.30 L/ha, afidi, cimici, piralide e diabrotica 0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

- **FRUMENTO** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi 0.30 L/ha, cimici 0.50 L/ha.

- **FRUMENTO, ORZO** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 L/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

COLZA: contro altiche e meligete 0.30 L/ha, afidi e punteruoli 0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

TABACCO: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (*Epitrix*) 0.30-0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

COTONE (SOLO PER USO TESSILE): contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, *lygus* 0.30 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

MEDICA: contro cavallette 0.50 L/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. La necessità del trattamento deve venire previamente constatata dall'Autorità regionale preposta ed il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

FLORICOLTURA (IN CAMPO O IN SERRA): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino 0.50 L/ha, tortricidi dei garofani (*Bega* e *Epicoristode*) 0.50-1.0 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

VIVAI E COLTURE ORNAMENTALI IN CAMPO O IN SERRA: contro afidi, cimice del platano (*Corythuca*), larve di lepidotteri, maggiolino 0.50 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg (di 7 gg in serra).
Pioppo:

CELL

- **IN VIVAO:** contro gemmaiola e tarlo vespa 0.50 L/ha, criptorinco 1.0 L/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

- **IN PIANTAGIONE:** contro criptorinco 1.0 L/ha, saperda 2.0 L/ha, crisomelidi defogliatori (crisomela, crisomelidi minori e stilpnotiae) 0.30-0.50 L/ha.

Diluire la dose indicata di **CELL** in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

CELL agisce per contatto ed ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia la più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamento delle foglie.

COMPATIBILITÀ: **CELL** è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.

Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di **CELL** preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.