

FREQUENT

COMPOSIZIONE
Fluazifop-p-butile puro
g 12.29 (125 g/l)

FORMULAZIONE
Concentrato emulsionabile

CONFEZIONI
bottiglia 1 l

CLASSIFICAZIONE
PERICOLO

REGISTRAZIONE Min. San.
n. 17670 del 28/07/2020



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

FREQUENT è un erbicida sistemico per il controllo post-emergenza delle infestanti graminacee annuali e perenni, a base di Fluazifop-P-butyl, sostanza attiva appartenente al gruppo chimico degli *aryloxy-phenoxy-propionati* (FOPs). Gruppo HRAC A. Assorbito dalle parti verdi delle piante, **FREQUENT** blocca la sintesi dei lipidi (perinibizione dell'AcetilCoACarbo-silasi) e arresta rapidamente la crescita.

Infestanti sensibili Annuali: forasacco (*Bromusspp.*), scagliola cangiante (*Phalarisbrachystachys*), loglio (*Lolium spp.*), avena (*Avena spp.*), scagliola minore (*Phalaris minor*), sanguinella (*Digitariasanguinalis*), giavone (*Echinochloaspp.*), coda di topo (*Alopecuruspp.*).

Perenni: panico strisciante (*Panicumrepens*), gramigna comune (*Agropyronrepens*), paspalo (*Paspalumspalodes*).

Infestanti mediamente sensibili

Annuali: agrostide (*Agrostisspp.*), pabbio (*Setariaspp.*).

Perenni: gramigna rampicante (*Cynodondactylon*), sorghetta (*Sorghumhalepense*).

Assicurarsi di trattare colture in buono stato vegetativo, con clima mite, in condizioni di elevata umidità dell'aria e su infestanti in attiva crescita.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Diserbo in campo: trattamento di tutte le parti aeree delle piante. Non raccogliere frutti a diretto contatto con il suolo.

Culture	Infestanti	Dose massima per trattamento	Numero massimo di applicazioni	Intervallo pre-raccolta (PHI)	Fascia di rispetto da corpiidrici (metri)	Fascia di rispetto da vegetazione naturale (metri)
Melanzana	Annuali	1,5 L/ha	1/anno	35 giorni	5	5
	Perenni	3 L/ha	1/anno	35 giorni	5	5
Barbabietola da industria e da foraggio	Annuali	1,5 L/ha	1/anno	56 giorni	5	5
	Perenni	3 L/ha	1/anno	56 giorni	5	5
Olivo	Annuali	2 L/ha	1/anno	28 giorni	5	5
Melo (1)	Perenni	2 L/ha	1/anno	28 giorni	5	5
Soia	Annuali	1,5 L/ha	1/anno	90 giorni	5	5
	Perenni	3 L/ha	1/anno	90 giorni	5	5
Girasole	Annuali	1,5 L/ha	1/anno	90 giorni	5	5
	Perenni	3 L/ha	1/anno	90 giorni	5	5

(1) Applicazione nel sottofila: non trattare più del 30% della superficie del frutteto.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: L'uso ripetuto dello stesso tipo di erbicidi a base di sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo chimico o con lo stesso meccanismo d'azione potrebbe portare alla comparsa di malerbe resistenti. Al fine di ridurre tale rischio, si raccomanda di alternare formulati a base di sostanze appartenenti a gruppi diversi con diversi meccanismi d'azione. Si raccomanda inoltre di adottare idonee pratiche agronomiche alternative di controllo delle infestanti, come la rotazione colturale e gli interventi meccanici. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti e informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza. Seguire le raccomandazioni delle autorità competenti nazionali e regionali.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Riempire il serbatoio per 3/4 di acqua pulita.

Iniziare ad agitare ed aggiungere la quantità corretta di **FREQUENT** con un dispositivo apposito (es. tramoggia di induzione) o aggiungendolo direttamente. Completare il riempimento agitando scrupolosamente, anche durante l'applicazione e le interruzioni. Eseguire il trattamento immediatamente dopo la preparazione della miscela.

MISCELE: Eventuali miscelazioni devono essere effettuate nel rispetto della regolamentazione vigente.