

PENNY

COMPOSIZIONE

Pendimetalin puro
g 35,7 (330 g/l)

FORMULAZIONE

Liquido emulsionabile

CONFEZIONI

bottiglia 1 ℓ
tanica 5 ℓ

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

REGISTRAZIONE Min. San.

n. 16322 del 12/05/2015



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

PENNY è un diserbante da applicare sul terreno nelle fasi di pre-emergenza, pre e post-trapianto. Agisce nei confronti di infestanti sia graminacee che dicotiledoni.

Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Setaria viridis* (Falso panico), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Panicum dichotomiorum* (Giavone americano).

Dicotiledoni: *Amaranthus* spp., *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Portulaca oleracea* (Erba cipollina), *Polygonum* spp., *Stellaria* spp., *Thlaspi arvense* (Erba storna).

Effettuare il trattamento su terreno ben livellato e lavorato. In assenza di pioggia dopo 7-10 giorni dal trattamento irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nei primi strati superficiali del terreno. Seminare in modo uniforme ad una profondità di 3-4 cm, evitando che alcuni semi rimangano scoperti in superficie.

GIRASOLE: applicare in pre-emergenza alla dose di 4 l/ha

MAIS: applicare in pre-emergenza alla dose di 5,3 l/ha

FAGIOLI E FAGIOLINI, FAVA E FAVINO: applicare in pre-emergenza alla dose di 4 l/ha

PISELLO: applicare in pre-emergenza alla dose di 4 -5 l/ha

CECE: applicare in pre-emergenza alla dose di 4 l/ha

CAROTA: applicare in pre-emergenza alla dose di 4 l/ha

ASPARAGO: applicare durante la fase di riposo vegetativo alla dose di 4 l/ha

PATATA: applicare in pre-emergenza alla dose di 5,3 l/ha

TABACCO: applicare alla fase di pre-trapianto alla dose di 5,3 l/ha

PEPERONE: applicare alla fase di pre-emergenza o pre-trapianto alla dose di 4 l/ha

CAVOLORE, BROCCOLI: applicare alla fase di pre-trapianto alla dose di 3,1-4 l/ha

SOIA: applicare alla fase di pre-emergenza alla dose di 3,1 l/ha

LATTUGHE e SIMILI (eccetto rucola): applicare alla fase di pre-emergenza o pre-trapianto alla dose di 3,1 l/ha

PIOPPA: applicare alla fase di post-trapianto alla dose di 2,8 -3,6 l/ha

VITE: applicare durante il riposo vegetativo alla dose di 4 l/ha

MELO, PERO: applicare tra il periodo della raccolta e la formazione dei nuovi frutti alla dose di 4 l/ha

ALBICOCCO, NETTARINA, PESCO: applicare tra il periodo della raccolta e la formazione dei nuovi frutti alla dose di 4 l/ha

ARACHIDE: applicare in pre-emergenza alla dose di 4 l/ha

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI: applicare in post- trapianto alla dose di 3,1 -4 l/ha

TAPPETI ERBOSI: applicare in post- emergenza alla dose di 3,1-4 l/ha.

Effettuare un solo intervento per ciclo colturale per tutte le colture.

Applicare il prodotto con un quantitativo d'acqua pari a 200 -800 l/ha in funzione del tipo di pompa impiegata. Impiegare la dose più alta in terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, mentre la dose più bassa in terreni sciolti.

FITOTOSSICITÀ

il prodotto può essere totossico nei confronti di colture non indicate in questa etichetta.

AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per l'asparago e 75 giorni prima della raccolta per lattughe e simili.