

# PROREX®

## REGOLATORE DI CRESCITA

### COMPOSIZIONE:

GIBBERELLINE A4 e A7 PURE .....	g 1,8 (19 g/l)
(isomero A4 + A7)	
6-BENZILADENINA PURA .....	g 1,8 (19 g/l)
Coadiuvanti .....	q.b. a g 100
(contiene alcol tetraidrofurfurillico)	

**FORMULAZIONE:** Concentrato solubile

**CLASSIFICAZIONE:** NON CLASSIFICATO

**REGISTRAZIONE:** n° 12857 del 09/11/2005 del Ministero della Salute

**CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:** Il **PROREX** è un fitoregolatore di crescita delle piante, che influenza in modo positivo i processi fisiologici del MELO con un incremento della qualità e della produzione; è dato dall'unione delle gibberelline A4 e A7 e dalla 6 benziladenina.

### MIGLIORAMENTO DELLA FORMA DEL MELO DEL GRUPPO DELLE DELICIOUS

Impiegare 70-100 ml per ettolitro trattando tra la fioritura all'80% e la caduta dei petali, è consigliabile in due applicazioni a ml 35-50 per ettolitro a 7-10 giorni di distanza.

**PREVENZIONE DELLA RUGGINOSITÀ DELLE MELE DELICIOUS** alla dose di ml 25-30 per ettolitro, con 3-4 trattamenti con il primo a fine della fioritura e i successivi ogni 7-10 giorni.


**ANTICIPO DI BRACHETTE SU ASTONI DI MELO NON IN PRODUZIONE E VIVAI** trattare a l 4,5-5,5 per ettaro equivalenti a litri 2,5 per ettolitro, su astoni della lunghezza di 50-70 cm che siano in piena crescita e con buono apparato fogliare.

Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (l 30 cm superiori).

**PERO** per il miglioramento dell'allegagione a ml 30-40 per hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori che siano aperti ed il secondo dopo circa 2-3 giorni al massimo.

**NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO** la quantità finale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento – è bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un Bagnante adesivo per avere una migliore azione – trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio – non trattare con temperature inferiori a 7°C e non superiore ai 32°C – usare un getto molto fine bagnando bene la pianta trattata e con creando sgocciolamento dopo il trattamento – non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4-5 giorni dall'ultimo trattamento.

**COMPATIBILITÀ:** compatibile con i bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile. Durante la preparazione delle miscele è opportuno aggiungere il **PROREX** nella dose richiesta per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).



**Confezioni:**  
Flacone da 0,500 l

\*Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto\*