

RAVANE PLUS 100 CS

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura
g 9,4 (100 g/l)

FORMULAZIONE

Sospensione di capsule

CONFEZIONI

bottiglia 1 l
bottiglia 0,500 l
bottiglia 0,250 l

CLASSIFICAZIONE ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.
n. 16835 del 22/12/2016



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

RAVANE PLUS 100 CS è un insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. **RAVANE PLUS 100 CS** unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. **RAVANE PLUS 100 CS** si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. **RAVANE PLUS 100 CS** si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. È importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 l)	Dose (ml/ha)	n. trattamenti	Intervallo tra i trattamenti
DRUPACEE (PESCO, NETTARINA)	Afidi (foglie non accartocciate)	10-15	100-150	1	-
	Mosca della frutta	15-17,5	150-175	2	14 giorni
DRUPACEE (ALBICOCCO)	Afidi (foglie non accartocciate)	15-25	150-250	1	-
	Mosca della frutta				
POMACEE (MELO, PERO)	Afidi (foglie non accartocciate)	15	150	1	-
	Carpocapsa	15	150	1-2	14 giorni
	Psilla del pero	15	150	1-2	14 giorni
NOCCIOLO	Balanino	20-25	200-250	1	-
VITE (da vino)	Tignola e tignoletta	25-30	250-300	1	-
	Cicaline	15-25	150-250	1	-
VITE (da tavola)	Cicaline	15	150	1	-
CEREALI (AVENA, FRUMENTO, ORZO)	Afidi	15-20	150-200	1	-
MAIS	Piralide	20-25	200-250	1	-
	Afidi	15-20	150-200	1	-
	Nottue	10-12,5	100-125	1	-
ZUCCHINI	Afidi	10-15	100-150	1	-
POMODORO (PIENO CAMPO)	Lepidotteri	15-20	150-200	1-2	14 giorni
	Afidi	10-15	100-150	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1-2	14 giorni

RAVANE PLUS 100 CS

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)	Dose (ml/ha)	n. trattamenti	Intervallo tra i trattamenti
PATATA	Dorifora	10-15	100-150	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	-	-
BRASSICACEAE (CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO)	Lepidotteri	15-20	150-200	1	-
	Afidi	10-15	100-150	1	-
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
FLOREALI ED ORNAMENTALI	Afidi	10-15	100-150	1	-

NOTE:

Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Eliminare le infestanti prima della fioritura.

Attenzione:

- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:

Coltura	Intervallo
POMODORO, ZUCCHINO	3 giorni
CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, MELO, PERO, PESCO, ALBICOCCO, NETTARINE NOCCIOLO	7 giorni
PATATA	15 giorni
VITE	21 giorni
MAIS	28 giorni
AVENA, FRUMENTO, ORZO	30 giorni

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.

Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.