

XANILO 45 WG

COMPOSIZIONE

Cymoxanil puro 45 g

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astuccio 0,500 Kg

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.

n. 12548 del 23/12/2005



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche. Viste le peculiari modalità di azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotto di contatto e/o endoterapici a diverso meccanismo e modalità d'azione. Per cipolla trattare fino alla fase di metà delle piante con foglie coricate e per carciofo trattare fino alla fase di raggiungimento del 50% della massa fogliare.

Colture		Dose g/hl	Dose g/ha	Max N° applicazioni	Min. N° gg tra applicazioni
VITE		30-35	300-330	4	7
PATATA		30-35	300-330	5	7
POMODORO, MELANZANA	Pieno campo	30-35	300-330	5	7
	Serra	30-35	300-330	5	7
MELONE, ANGIURIA, ZUCCA	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
ZUCCHINO, CETRIOLO	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
	Serra	25-30	270	4	8
LATTUGHE	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
SPINACI	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
CIPOLLA	Pieno campo	30-40	400-500	4	8
CARCIOFO	Pieno campo	30-40	300-400	4	8

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 5 e 6. Qualora si utilizzino apparecchiature a basso volume impiegare la dose di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.

Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare XANILO 45 WG ad altri fungicidi.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti: 28 giorni prima della raccolta per vite; 14 giorni prima della raccolta per carciofo; 11 giorni prima della raccolta per melone, anguria, zucca, 10 giorni prima della raccolta per lattughe, spinaci e cipolla; 7 giorni prima della raccolta per patata; 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, zucchini, cetriolo.