

CASINO ROYALE

COMPOSIZIONE

Boscalid puro 26,7 g
Piraclostrobina 6,7 g

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astuccio 1 Kg

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



REGISTRAZIONE Min. San.

n. 17682 del 17/02/2021



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

CASINO ROYALE è un fungicida con proprietà protettive, curative e translaminari contenente le sostanze attive boscalid e piraclostrobin. Boscalid appartiene al gruppo delle carbossamidi (FRAC 7) e la piraclostrobina è un metossicarbammato (FRAC 11). Applicare **CASINO ROYALE** in un massimo di 2 applicazioni consecutive e prima della terza applicazione, applicare una sostanza attiva con modalità di azione differente.

CASINO ROYALE si applica come spray fogliare quando sono visibili i primi sintomi della malattia secondo le seguenti raccomandazioni:

| Coltura | Avversità | Periodo di applicazione | Numero di applicazioni | Intervallo fra le applicazioni | Dose (kg/ha) | Volume di acqua L/ha |
|--|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| POMODORO (in pieno campo) | <i>Alternaria sp.</i> | Dalla formazione dei primi germogli apicali fino a maturazione (BBCH 20-87) | 3 | 8-10 giorni | 1,5 | 500-1000 |
| | <i>Phytophthora infestans</i> | | 2 | | | |
| MELANZANA (in pieno campo) | Oidio | Dalla formazione dei primi germogli apicali fino a maturazione (BBCH 20-87) | 3 | 8-10 giorni | 1,5 | 500-1000 |
| MELANZANA (campo e serra) | <i>Botrytis spp</i> | Dalla formazione dei primi germogli apicali fino alla fase di sviluppo dei frutti (BBCH 21-79) | 3 | 7-10 giorni | 1,5 | 400-1000 |
| BARBABIETO- LA DA ZUC- CHERO | <i>Cercospora beticola</i> | Durante la formazione della rosetta (BBCH 31-39) | 2 | 8-10 giorni | 1,5 | 300-600 |
| DRUPACEE: CILIEGIO, PE- SCO, NETTARI- NO, ALBICOCCO, PRUGNO | <i>Monilinia laxa</i> | Da inizio fioritura fino all'allegagione (BBCH 61-73) | 3 | 7-14 giorni | 0,6-0,75 | 1000 |
| | <i>Sphaerotheca pannosa</i> | | | | 0,6 | |
| SCALOGNO (in pieno campo) | Botrite | Dalla 3° foglia vera fino alle prime fasi di accrescimento del bulbo (BBCH 13-45) | 1 | - | 1,5 | 1000 |
| COLTURE ORNAMENTALI ERBACEE (campo e serra) | Botrite e oidio | Dalla 3° foglia vera fino alla fine della fioritura (BBCH 13-69) | 1 | - | 1,0-1,5 | 400-1000 |
| COLTURE ORNAMENTALI LEGNOSE (campo e serra) | Botrite e oidio | Dalla 3° foglia vera fino alla fine della fioritura (BBCH 13-69) | 2 | 7-10 giorni | 1,0-1,5 | 400-1000 |

In caso di perdita del raccolto non coltivare nel campo trattato almeno fino a 365 giorni dopo l'applicazione del prodotto. Non coltivare alcuna coltura prima di 365 giorni dopo l'applicazione del prodotto.

CASINO ROYALE

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA ED APPLICAZIONE

Non preparare più miscela di quanto necessario. Riempire a metà il serbatoio con acqua ed iniziare l'agitazione, aggiungere la quantità richiesta di CASINO ROYALE nel serbatoio e completare il riempimento con acqua fino al raggiungimento del volume desiderato. Continuare l'agitazione fino a completamento del trattamento mediante applicazione spray.

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature utilizzate e gli indumenti protettivi contaminati devono essere lavati con acqua o una soluzione detergente diluita ed accuratamente risciacquati. Occorre fare attenzione a non contaminare i corsi d'acqua con le acque di lavaggio che dovrebbero essere smaltite in sicurezza secondo le normative locali. Evitare le fuoriuscite. In caso di fuoriuscita, togliere gli indumenti contaminati e lavare immediatamente la cute. Subito dopo il trattamento, pulire l'attrezzatura. Svuotare il serbatoio e sciacquare con dispositivi automatici a pressione, oppure manualmente tre volte.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORE E MELANZANA;

7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER DRUPACEE (CILIEGIO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, PRUGNO);

14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E SCALOGNO.