

# ACTIGAN EKO

## COMPOSIZIONE

Pendimetalin puro  
40 g (400 g/l)

## FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

## CONFEZIONI

bottiglia 1 ℓ  
tanica 5 ℓ

## CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE

## REGISTRAZIONE Min. San.

n. 17660 del 17/09/2020



## CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

**ACTIGAN EKO** è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali, sia graminacee sia dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di plantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

### INFESTANTI SENSIBILI:

**GRAMINACEE:** *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Lolium* spp. (loietto), *Phalaris* spp. (falaride), *Poa annua* (fienarola), *Setaria* spp. (pabbio).

**DICOTILEDONI:** *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Chenopodium* spp. (farinello), *Chrysanthemum segetum* (crisantemo), *Diploaxis erucoides* (ruchetta), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Lactuca serriola* (lattuga selvatica), *Matricaria* spp. (camomilla), *Papaver rhoeas* (papavero), *Picris echioides* (aspraggine), *Polygonum* spp. (poligoni), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Sinapis* spp. (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus* spp. (grespino), *Veronica* spp. (veronica).

Distribuire il prodotto mediante applicazione al suolo con attrezzatura a bassa pressione alle dosi specificate per ciascuna coltura e con un volume d'acqua compreso tra 200 e 600 l/ha. Si raccomanda di impiegare la dose alta in suoli argillosi o con elevato tenore in sostanza organica e la dose più bassa in terreni leggeri. Effettuare una sola applicazione per ciclo colturale facendo seguire all'applicazione una irrigazione, se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento, o una lavorazione meccanica al fine di incorporare il prodotto nel terreno.

**AGRUMI, POMACEE (MELO, PERO, COTOGNO, NESPOLO), DRUPACEE (PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO):** impiegare alla dose di 3 l/ha da post-raccolta fino ad inizio fioritura.

**VITE (UVE DA VINO E DA TAVOLA):** impiegare alla dose di 3 l/ha da post-raccolta fino a ripresa vegetativa

**FRAGOLA:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-trapianto o in post-trapianto tra le file.

**AGLIO:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (1-3 foglie).

**CARCIOFO:** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-emergenza o pre-ricaccio.

**CAVOLI (CAVOLI A TESTA, CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLETTI DI BRUXELLES):** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-trapianto.

**CIPOLLA:** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto.

**COTONE:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o pre-semina.

**FRUMENTO, ORZO:** impiegare alla dose di 3 l/ha.

**GIRASOLE:** impiegare alla dose di 3 l/ha

**LEGUMINOSE DA GRANELLA (FAGIOLI E FAGIOLINI, PISELLI):** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o pre-semina.

**PISELLI PER IL CONSUMO FRESCO:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza.

**MAIS:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (1-3 foglie).

**PATATA:** impiegare alla dose di 3 l/ha

**PEPERONE:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-trapianto Pomodoro: impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-trapianto o in post-trapianto tra le file.

**SEDANO:** impiegare alla dose di 2,5 l/ha in pre-trapianto.

**SOIA:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-semina

**TABACCO:** impiegare alla dose di 3 l/ha in pre-trapianto o in post-trapianto tra le file.

## PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO

Al fine di permettere al prodotto di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture indicate, attenersi alle seguenti modalità operative:

# ACTIGAN EKO

- Preparare il letto a semina in modo da operare su terreno ben livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta, provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno
- Effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità adeguata, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra;
- Nel caso di colture trapiantate effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendendo almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale va somministrata un'altra leggera irrigazione: in nessun caso si debbono rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento;
- Nella generalità dei casi, al fine di ampliare lo spettro di azione sulle infestanti, si consiglia di impiegare **ACTIGAN EKO** in miscela con altri erbicidi.
- Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire il serbatoio dell'irroratore per il 50% del suo contenuto, versare il prodotto e portare a volume mantenendo costantemente in agitazione.
- Distribuire la miscela operando uniformemente in modo da evitare lacune e sovrapposizioni;
- Quando si usa il prodotto in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra nelle caratteristiche del prodotto;
- Dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua tutte le attrezzature utilizzate per l'applicazione di **ACTIGAN EKO** e i suoi contenitori, ripetere il lavaggio almeno 3 volte. Assicurarsi che tutto il liquido venga rimosso dal serbatoio dell'irroratrice, dalla pompa e dalle tubature rimuovendo gli ugelli e aprendo gli scarichi del serbatoio e della pompa. Non riversare l'acqua di lavaggio nei canali delle acque reflue. Prima di iniziare a lavare le irroratrici leggere le istruzioni del produttore.

## FITOTOSSICITÀ

Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le colture da seme riportate in etichetta è indispensabile attenersi alle modalità e profondità di semina consigliate. Nei trattamenti su carciofo, assicurarsi che, direttamente per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

## COMPATIBILITÀ

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE FOGLIE DI TABACCO E 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CARCIOFO, SEDANO E CAVOLI**