

COMBIRAM 25 WG

COMPOSIZIONE

Cimoxanil puro g 4
RAME metallico g 25
(sotto forma di ossicloruro di rame)

FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astuccio 1 Kg
sacco 10 Kg

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



REGISTRAZIONE Min. San.

n. 17704 del 1/10/2020



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

COMBIRAM® 25 WG è un fungicida in microgranuli idrodispersibili, efficace contro la Peronospora e altre malattie fungine che colpiscono vite, pomodoro, melone e cetriolo. **COMBIRAM® 25 WG** è una miscela di due principi attivi, di cui l'ossicloruro di rame possiede azione preventiva e lunga persistenza, mentre il cymoxanil ha prontezza d'azione ed effetto curativo, in quanto penetra nelle foglie. Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

COMBIRAM® 25 WG va impiegato seguendo i normali calendari di lotta a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori riducendo l'intervallo di tempo fra un trattamento e l'altro). Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite e 500-800 l/ha su orticole). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata.

Coltura	Avversità	Epoche d'impiego	Dosi d'impiego	Dosi/ha	N. max trattamenti/anno	Intervallo tra i trattamenti (gg)
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	- trattamenti pre-fiorali - trattamenti post-fiorali - trattamenti di "chiusura"	250-300gr/hl 250-300gr/hl 250-300gr/hl	2,50-3,0Kg	4	8-10
POMODORO (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i>)	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	280-600gr/hl	2,50-3,0Kg	4	8-10
CUCURBITACEE (cetriolo e melone) (in campo)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		280-600gr/hl	2,50-3,0Kg	4	8-10

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare indumenti da lavoro e guanti protettivi. Data la classificazione del prodotto indossare una protezione per viso/occhi quando si maneggia il concentrato. Rispettare una fascia di vegetazione non trattata di 10 metri quando si applica il prodotto su melone e cucurbitacee per proteggere i residenti/astanti. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le ispezioni in campo indossare abiti da lavoro. Durante le attività di mantenimento, che potranno essere iniziate solo a 33 giorni dall'ultimo trattamento per la vite, indossare sempre indumenti da lavoro e guanti. Durante le attività di raccolta indossare sempre indumenti da lavoro e guanti. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per gli usi su pomodoro e cucurbitacee. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per gli usi su vite.

COMPATIBILITÀ: **COMBIRAM® 25 WG** può essere miscelato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con prodotti a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare **COMBIRAM® 25 WG** ad altri fungicidi.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 33 giorni prima della raccolta per vite, 10 giorni per le altre colture.