

DIVIN



COMPOSIZIONE

Difenoconazolo puro
g 23,23 (250 g/l)

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

CONFEZIONI

bottiglia 1 l

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

REGISTRAZIONE Min. San.

n. 18300 del 2/11/2023



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

DIVIN è un fungicida sistemico di contatto a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli (meccanismo d'azione FRAC 3), dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa. Ha un ampio spettro di azione ed è efficace contro un gran numero di malattie fungine. È rapidamente assorbito dalle parti verdi della pianta e non viene dilavato dalla pioggia.

Colture	Avversità	Dose (L/ha)	Volume di irrorazione (L acqua/ha)	Numero max di tratt. all'anno	Intervallo tra i tratt. (giorni)	Epoca d'impiego
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercosporiosi (<i>Cercospora beticola</i>)	0,2 - 0,3	500-1000	3	15-20	Durante la crescita della rosetta (BBCH 30-41)
MELO, PERO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,15	300-1000	4	10	Dall'ingrossamento dei frutti (BBCH 77) fino alla maturazione di raccolta (BBCH 89)
CAROTA	Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.), ruggine (<i>Puccinia</i> spp.), oidio (<i>Erysiphe</i> sp.), <i>Mycosphaerella</i> sp.	0,4 - 0,5	100-500	3	7-14	Durante lo sviluppo della radice (BBCH 40-48)
VITE, DA VINO E DA TAVOLA	Marciume nero (<i>Guignardia bidwellii</i>), oidio (<i>Erysiphe</i> sp.)	0,2	800-1000	3	10-14	Dalla fase di terza foglia (BBCH 13) all'inizio della maturazione (BBCH 81)
CAVOLFIORE	Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	0,2	400-1000	2	10	Durante lo sviluppo della testa (BBCH 40-51)

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire metà del serbatoio con acqua pulita e azionare l'agitatore della botte. Lentamente, aggiungere la quantità di **DIVIN** necessaria. Sciacquare i contenitori vuoti e aggiungere l'acqua di risciacquo nel serbatoio. Aggiungere il resto dell'acqua fino a raggiungere il volume complessivo necessario. Mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, fino al completamento del trattamento.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

DIVIN contiene difenoconazolo (gruppo 3 FRAC). Per evitare o ritardare insorgenza di fenomeni di resistenza, applicare CORE in una strategia di difesa che preveda l'alternanza di fungicidi a differente meccanismo di azione e non superare il numero massimo di applicazioni consigliato.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti:

- 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, melo, pero e vite (da vino e da tavola);
- 14 giorni prima della raccolta per carota e cavolfiore.