

FOLLOW 80 WG

COMPOSIZIONE

Folpet puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

astuccio 1 Kg
sacco 10 Kg

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



REGISTRAZIONE Min. San.

n. 16179 del 21/10/2014



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

FOLLOW 80 WG è un fungicida organico ad azione preventiva e curativa, attivo contro la Botrite, la Peronospora ed altre malattie fungine della vite e contro la Peronospora del pomodoro. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale.

VITE (UVE DA VINO): contro *Plasmopara viticola*, *Botrytis cinerea*, *Uncinula necator*, *Phomopsis viticola*, *Guignardia bidwelli*, *Coniella diplodiella*.

Trattare con 1.875 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di 5 foglie distese (BBCH 15) in maniera preventiva o quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Proseguire i trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni, fino ad un massimo di 8 applicazioni.

POMODORO (in campo): contro *Phytophthora infestans*.

Trattare con 1.56 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di inizio invaiatura (BBCH 71) in maniera preventiva o quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Proseguire i trattamenti ad intervalli di 7 giorni, fino ad un massimo di 4 applicazioni.

POMODORO (in serra): contro *Phytophthora infestans*.

Trattare con 2 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di inizio invaiatura (BBCH 71) in maniera preventiva o quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Proseguire i trattamenti ad intervalli di 7 giorni, fino ad un massimo di 3 applicazioni.

COMPATIBILITÀ:

FOLLOW 80 WG non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE E 7 GIORNI PRIMA DELLA DELLA RACCOLTA SU POMODORO.