

MULLOMO 700 WG

NEW

COMPOSIZIONE

Ditianon puro g 70

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

sacco 1 Kg
sacco 5 Kg

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



REGISTRAZIONE Min. San.

in corso



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.

Eseguire fino ad un massimo di 6 trattamenti preventivi all'anno ad intervalli di 5 giorni per la dose di 0.5 kg/ha e ad intervalli di 7 giorni per la dose di 0.75 kg/ha in funzione dell'andamento meteorologico e della virulenza delle malattie.

MELO - Contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), marciume lenticellare (*Gloeosporium* spp.) e cancri rameali (*Nectria galligena*): 0,5-0,75 kg/ha (33-50 g/hl).

PERO - Contro ticchiolatura (*Venturia pyrina*) e cancri del legno (*Nectria galligena*): 0,5-0,75 kg/ha (33-50 g/hl). Utilizzare la dose di 0.5 kg/ha a partire dalla stadio di schiusura gemme fino al raggiungimento della dimensione finale tipica dei frutti e la dose di 0.75 kg/ha a partire dallo stadio di bottoni rossi fino al raggiungimento del 30% della dimensione finale dei frutti. Non superare i 6 trattamenti totali per anno di cui solo 3 alla dose massima di 0.75 kg/ha.

Usare volumi d'acqua pari a 200-1500 litri per ettaro in funzione dello stadio di sviluppo della coltura, rispettando le dosi massime per ettaro consentite.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.

COMPATIBILITÀ: Il formulato è miscibile con prodotti emulsionabili; è opportuno però che la miscela venga impiegata subito dopo la preparazione e che venga mantenuta in costante agitazione. Per alcune miscele può essere necessaria l'aggiunta di un agente antischiuma. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITÀ: Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta, causa il potere marcante del prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 42 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELE E PERE.