

# PREQUEL

NEW

## COMPOSIZIONE

Propaquizafop puro  
g 9,70 (= 100 g/l)

## FORMULAZIONE

Emulsione Concentrata

## CONFEZIONI

bottiglia 1 ℓ  
tanica 5 ℓ

## CLASSIFICAZIONE PERICOLO



REGISTRAZIONE Min. San.  
in corso di registrazione



## CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

**PREQUEL** è un erbicida ad azione graminicida, a base di propaquizafop, per il controllo di post-emergenza delle infestanti nelle colture a foglia larga. Il prodotto è attivo contro:

**Infestanti annuali:** *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena fatua* (avena selvatica), *Avena sterilis* (Avena Maggiore), *Bromus* spp. (forasacco), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone), *Eleusine indica* (gramigna indiana), *Hordeum* spp., *Lolium* spp. (loglio), *Phalaris* spp. (falaride), *Setaria* spp. (setaria), *Sorghum halepense* (sorghetta).

**Infestanti perenni:** *Agrostis* spp., *Cynodon dactylon* (gramigna), *Elymus* (*Agropyron*) *repens* (agropiro comune), *Poa trivialis* (fienarola comune), *Poa pratensis* (fienarola dei prati).

Utilizzare **PREQUEL** in pieno campo post-emergenza della coltura secondo le seguenti modalità:

| Colture   | Dose [L/ha]                                   | Volume di irrorazione (L acqua/ha) | Numero max di tratt. a stagione |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>POMODORO</b>   | 1,2   | 300-400                            | 1                               |
| <b>COTONE, TABACCO, PATATA E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b> | 0,75 - 1,2 *<br>1,5 - 2,0 **<br>1,0 - 1,5 *** | 200-600                            | 1                               |

\* in caso di infestanti annuali dallo stadio di 2-3 foglie fino all'inizio dell'elongazione degli steli.

\*\* in caso di infestanti perenni quando l'altezza delle infestanti è di 15-20 cm.

\*\*\* in caso di sorghetta (*Sorghum halepense*) quando l'altezza dell'infestante è di 30-40 cm.

## GESTIONE DELLE RESISTENZE

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di infestanti resistenti, si raccomanda di applicare **PREQUEL** in strategie di diserbo che includano prodotti a differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici, meccanici e fisici. Attenersi strettamente a quanto indicato in etichetta.

## FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo un trattamento con **PREQUEL** non seminare o trapiantare in successioni le seguenti colture prima che siano trascorse: 10 settimane per frumento orzo, segale e mais; 16 settimane per avena, 4 settimane per piselli, fagioli e colza.

## COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**Avvertenze:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

## PREPARAZIONE DELLA MISCELA, APPLICAZIONE E PULIZIA

Non preparare più miscela del necessario. Riempire a metà il serbatoio con acqua. Aggiungere agitando la quantità richiesta di prodotto e completare il riempimento con acqua fino al raggiungimento del volume desiderato, continuando l'agitazione. Lavare con acqua tutte le attrezzature svuotate dal prodotto, risciacquare 2 o 3 volte fino a che la schiuma e le tracce del prodotto siano rimosse. Svuotare il contenitore e sciacquare con un dispositivo a pressione oppure manualmente tre volte. Dopo averlo forato per evitarne il riutilizzo, smaltirlo in appositi punti di raccolta.

## INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti:

90 giorni prima della raccolta per cotone; 45 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero;

40 giorni prima della raccolta per patata e tabacco; 30 giorni prima della raccolta per pomodoro.